

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和 7 年度	
測定年月日			R7. 4. 11	平均
天候			曇	—
気温[℃]			19. 0	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	45. 0	45. 0
	合成樹脂類	[%]	25. 4	25. 4
	ゴム・皮革類	[%]	0. 0	0. 0
	木・竹・わら類	[%]	13. 9	13. 9
	ちゅう芥類	[%]	9. 9	9. 9
	不燃物類	[%]	2. 8	2. 8
	その他	[%]	3. 0	3. 0
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	40. 2	40. 2
	合成樹脂類	[%]	16. 9	16. 9
	ゴム・皮革類	[%]	0. 0	0. 0
	木・竹・わら類	[%]	13. 9	13. 9
	ちゅう芥類	[%]	24. 9	24. 9
	不燃物類	[%]	1. 5	1. 5
	その他	[%]	2. 6	2. 6
単位容積重量		[kg/m³]	155	155
ごみの3成分	水分	[%]	46. 20	46. 2
	灰分（生ごみ）	[%]	6. 28	6. 3
	可燃分	[%]	47. 52	47. 5
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 861	1, 861
		[kJ/kg]	7, 790	7, 790
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 193	2, 193
		[kJ/kg]	9, 180	9, 180
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 67	11. 67

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和6年度									
測定年月日			R6. 4. 18	R6. 5. 8	R6. 6. 4	R6. 7. 9	R6. 10. 11	R6. 12. 3	R7. 1. 8	R7. 2. 3	R7. 3. 4	平均
天候			晴	晴	曇	曇	晴	晴	晴	曇	曇	—
気温[℃]			22. 0	23. 0	21. 2	32. 5	21. 0	20. 5	9. 8	11. 0	10. 6	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	49. 00	51. 8	54. 5	51. 7	55. 6	52. 4	52. 3	58. 2	54. 6	53. 3
	合成樹脂類	[%]	22. 5	25. 4	19. 4	22. 5	19. 8	24. 9	20. 6	17. 1	22. 0	21. 6
	ゴム・皮革類	[%]	2. 9	1. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	1. 6	0. 0	0. 0	0. 6
	木・竹・わら類	[%]	6. 9	6. 5	9. 2	12. 7	10. 9	9. 1	8. 3	11. 1	9. 4	9. 3
	ちゅう芥類	[%]	14. 1	10. 7	11. 7	8. 4	9. 6	8. 2	13. 4	9. 7	11. 3	10. 8
	不燃物類	[%]	2. 4	3. 2	2. 2	2. 7	2. 5	3. 3	2. 1	2. 3	1. 4	2. 5
	その他	[%]	2. 2	1. 1	3. 0	2. 0	1. 6	2. 1	1. 7	1. 6	1. 3	1. 8
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	43. 7	47. 3	49. 8	46. 2	50. 2	48. 2	45. 5	49. 9	45. 1	47. 3
	合成樹脂類	[%]	15. 2	18. 2	13. 2	15. 8	13. 7	16. 3	13. 3	11. 6	15. 7	14. 8
	ゴム・皮革類	[%]	1. 7	0. 8	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	1. 0	0. 0	0. 0	0. 4
	木・竹・わら類	[%]	6. 7	5. 7	8. 5	14. 1	9. 6	10. 5	7. 7	10. 1	8. 5	9. 0
	ちゅう芥類	[%]	29. 5	25. 00	24. 7	20. 2	23. 3	20. 7	29. 8	25. 3	28. 4	25. 2
	不燃物類	[%]	1. 3	1. 9	1. 2	1. 6	1. 4	1. 8	1. 1	1. 3	0. 8	1. 4
	その他	[%]	1. 9	1. 1	2. 6	2. 1	1. 8	2. 5	1. 6	1. 8	1. 5	1. 9
単位容積重量		[kg/m³]	149	160	157	151	143	151	146	152	145	150
ごみの成分	水分	[%]	45. 09	41. 02	44. 73	41. 47	43. 61	46. 13	48. 23	44. 76	43. 22	44. 3
	灰分（生ごみ）	[%]	6. 41	6. 85	6. 43	7. 47	6. 34	6. 58	6. 16	6. 26	6. 35	6. 5
	可燃分	[%]	48. 50	52. 13	48. 84	51. 06	50. 05	47. 29	45. 61	48. 98	50. 43	49. 2
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 912	2, 100	1, 929	2, 049	1, 991	1, 851	1, 763	1, 936	2, 010	1, 949
		[kJ/kg]	8, 004	8, 791	8, 075	8, 577	8, 334	7, 748	7, 380	8, 104	8, 414	8, 159
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 211	2, 459	2, 198	2, 364	2, 218	2, 155	2, 009	2, 107	2, 316	2, 226
		[kJ/kg]	9, 255	10, 293	9, 201	9, 896	9, 285	9, 021	8, 410	8, 820	9, 695	9, 320
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 68	11. 62	11. 64	12. 76	11. 25	12. 21	11. 89	11. 34	11. 18	11. 73

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和 5 年度												
測定年月日			R5. 4. 12	R5. 5. 11	R5. 6. 2	R5. 7. 7	R5. 8. 4	R5. 9. 8	R5. 10. 2	R5. 11. 7	R5. 12. 4	R6. 1. 9	R6. 2. 2	R6. 3. 4	平均
天候			晴	曇	雨	晴	晴	雨	曇	晴	晴	晴	曇	晴	—
気温[℃]			20. 5	21. 0	23. 6	30. 5	29. 0	29. 0	26. 4	24. 6	16. 0	9. 0	11. 0	10. 5	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	50. 8	47. 4	46. 2	52. 1	49. 5	50. 6	53. 7	61. 4	55. 4	52. 9	57. 5	50. 6	52. 3
	合成樹脂類	[%]	18. 5	25. 1	23. 4	21. 9	18. 1	20. 6	19. 2	15. 0	21. 2	19. 2	19. 3	26. 4	20. 7
	ゴム・皮革類	[%]	0. 5	2. 5	1. 4	0. 0	1. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 5
	木・竹・わら類	[%]	14. 1	10. 9	13. 0	10. 6	12. 6	16. 1	10. 8	10. 1	8. 2	10. 5	11. 1	8. 6	11. 4
	ちゅう芥類	[%]	12. 1	10. 5	10. 6	10. 3	13. 7	9. 4	11. 7	9. 0	9. 9	12. 2	8. 0	11. 6	10. 8
	不燃物類	[%]	2. 3	2. 2	3. 3	4. 0	2. 7	1. 2	1. 9	2. 8	2. 5	3. 3	2. 0	1. 4	2. 5
	その他	[%]	1. 7	1. 4	2. 1	1. 1	1. 9	2. 1	2. 7	1. 7	2. 8	1. 9	2. 1	1. 4	1. 9
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	46. 3	45. 3	41. 7	48. 1	42. 5	47. 3	49. 5	53. 1	48. 7	46. 9	50. 5	46. 3	47. 2
	合成樹脂類	[%]	12. 3	17. 1	15. 7	14. 3	12. 5	14. 4	12. 7	10. 6	14. 4	13. 5	14. 3	18. 9	14. 2
	ゴム・皮革類	[%]	0. 3	1. 6	0. 9	0. 0	0. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 3
	木・竹・わら類	[%]	11. 9	10. 4	14. 0	9. 8	12. 1	13. 2	9. 5	10. 8	7. 3	9. 1	10. 7	7. 2	10. 5
	ちゅう芥類	[%]	26. 2	22. 5	23. 5	24. 5	28. 7	22. 1	24. 1	22. 1	25. 3	26. 7	21. 0	25. 6	24. 4
	不燃物類	[%]	1. 2	1. 2	1. 8	2. 1	1. 5	0. 7	1. 0	1. 6	1. 4	1. 9	1. 2	0. 8	1. 4
	その他	[%]	1. 8	1. 9	2. 4	1. 2	1. 8	2. 3	3. 2	1. 8	2. 9	1. 9	2. 3	1. 2	2. 1
単位容積重量		[kg/m³]	168	166	184	155	167	149	162	165	153	145	129	155	158
ごみの3成分	水分	[%]	46. 36	43. 88	46. 49	47. 30	45. 04	42. 96	46. 59	42. 08	45. 41	42. 29	40. 17	42. 44	44. 3
	灰分（生ごみ）	[%]	6. 11	6. 51	6. 39	7. 12	6. 46	6. 20	6. 33	6. 78	6. 01	7. 40	6. 75	6. 19	6. 5
	可燃分	[%]	47. 53	49. 61	47. 12	45. 58	48. 50	50. 84	47. 08	51. 14	48. 58	50. 31	53. 08	51. 37	49. 2
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 861	1, 969	1, 841	1, 767	1, 912	2, 030	1, 839	2, 049	1, 914	2, 010	2, 148	2, 057	1, 950
		[kJ/kg]	7, 790	8, 242	7, 706	7, 397	8, 004	8, 498	7, 698	8, 577	8, 012	8, 414	8, 992	8, 611	8, 162
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 099	2, 377	2, 175	2, 090	2, 120	2, 316	2, 106	2, 219	2, 162	2, 276	2, 414	2, 487	2, 237
		[kJ/kg]	8, 786	9, 950	9, 105	8, 749	8, 874	9, 695	8, 816	9, 289	9, 050	9, 527	10, 105	10, 411	9, 363
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 40	11. 60	11. 95	13. 52	11. 76	10. 87	11. 86	11. 71	11. 01	12. 83	11. 28	10. 76	11. 71

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和 4 年度												
測定年月日			R4. 4. 11	R4. 5. 6	R4. 6. 3	R4. 7. 4	R4. 8. 5	R4. 9. 2	R4. 10. 3	R4. 11. 2	R4. 12. 2	R5. 1. 5	R5. 2. 3	R5. 3. 2	平均
天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—
気温[℃]			21. 5	19. 2	25. 2	31. 0	38. 0	26. 5	25. 2	17. 0	15. 0	8. 0	6. 2	14. 0	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[％]	47. 8	49. 2	52. 2	52. 8	51. 3	55. 8	50. 0	51. 4	52. 3	49. 1	59. 1	52. 9	52. 0
	合成樹脂類	[％]	27. 5	24. 3	21. 8	24. 5	22. 9	19. 9	25. 5	23. 9	18. 3	21. 6	18. 3	21. 8	22. 5
	ゴム・皮革類	[％]	0. 9	0. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0	1. 1	0. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 3
	木・竹・わら類	[％]	8. 0	11. 9	12. 2	10. 4	12. 5	10. 8	9. 5	11. 3	13. 7	12. 1	10. 5	11. 4	11. 2
	ちゅう芥類	[％]	10. 0	8. 5	9. 2	7. 7	8. 3	8. 7	11. 2	8. 7	11. 3	12. 4	9. 3	9. 8	9. 6
	不燃物類	[％]	3. 2	3. 6	2. 8	2. 9	3. 5	2. 3	1. 7	2. 3	2. 3	2. 7	1. 5	3. 0	2. 7
	その他	[％]	2. 6	1. 6	1. 8	1. 7	1. 5	2. 5	2. 1	1. 3	1. 6	2. 1	1. 3	1. 1	1. 8
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[％]	44. 1	46. 2	48. 2	49. 1	46. 7	51. 7	48. 2	51. 1	47. 3	45. 7	53. 3	48. 1	48. 3
	合成樹脂類	[％]	19. 2	17. 3	15. 3	17. 9	15. 2	13. 9	16. 6	15. 2	12. 5	14. 8	13. 1	15. 2	15. 5
	ゴム・皮革類	[％]	0. 5	0. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 6	0. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 2
	木・竹・わら類	[％]	8. 6	10. 6	9. 1	9. 6	12. 2	9. 7	8. 9	10. 2	11. 6	9. 7	8. 3	9. 3	9. 8
	ちゅう芥類	[％]	23. 7	21. 8	24. 3	19. 9	22. 6	20. 8	23. 6	20. 6	25. 5	26. 5	23. 1	24. 5	23. 1
	不燃物類	[％]	1. 8	2. 1	1. 5	1. 7	1. 9	1. 3	0. 9	1. 2	1. 3	1. 5	0. 9	1. 7	1. 5
	その他	[％]	2. 1	1. 4	1. 6	1. 8	1. 4	2. 6	1. 8	1. 1	1. 5	1. 8	1. 3	1. 2	1. 6
単位容積重量		[kg/m³]	154	155	146	152	169	147	162	155	154	176	166	149	157
ごみの3成分	水分	[％]	43. 72	41. 80	45. 52	41. 77	46. 45	43. 50	46. 06	48. 51	44. 09	45. 24	40. 69	42. 87	44. 2
	灰分（生ごみ）	[％]	6. 26	7. 09	6. 06	6. 63	6. 56	6. 35	5. 70	5. 84	5. 94	6. 73	5. 91	6. 85	6. 3
	可燃分	[％]	50. 02	51. 11	48. 42	51. 60	46. 99	50. 15	48. 24	45. 65	49. 97	48. 03	53. 40	50. 28	49. 5
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 989	2, 049	1, 906	2, 071	1, 836	1, 996	1, 894	1, 763	1, 984	1, 890	2, 159	2, 005	1, 962
		[kJ/kg]	8, 326	8, 577	7, 979	8, 669	7, 685	8, 355	7, 928	7, 380	8, 305	7, 912	9, 038	8, 393	8, 212
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 414	2, 474	2, 198	2, 469	2, 154	2, 279	2, 226	2, 133	2, 170	2, 167	2, 364	2, 366	2, 285
		[kJ/kg]	10, 105	10, 356	9, 201	10, 335	9, 017	9, 540	9, 318	8, 929	9, 084	9, 071	9, 896	9, 904	9, 563
灰分（乾燥ごみ）		[％]	11. 13	12. 18	11. 13	11. 38	12. 25	11. 24	10. 57	11. 34	10. 62	12. 29	9. 96	11. 99	11. 34