

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和 7 年度							
測定年月日			R7. 4. 11	R7. 5. 9	R7. 6. 3	R7. 7. 4	R7. 8. 5	R7. 9. 2	R7. 10. 3	平均
天候			曇	晴	雨	晴	晴	晴	晴	—
気温[℃]			19. 0	21. 4	21. 2	30. 0	33. 0	31. 2	26. 0	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	45. 0	51. 8	49. 7	55. 4	53. 4	56. 1	48. 7	51. 4
	合成樹脂類	[%]	25. 4	25. 6	24. 5	20. 4	19. 1	17. 3	23. 3	22. 2
	ゴム・皮革類	[%]	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	2. 3	0. 0	0. 0	0. 3
	木・竹・わら類	[%]	13. 9	10. 2	8. 6	12. 8	11. 6	13. 6	14. 2	12. 1
	ちゅう芥類	[%]	9. 9	8. 8	10. 7	8. 9	10. 2	10. 7	12. 5	10. 2
	不燃物類	[%]	2. 8	1. 9	4. 0	1. 2	1. 6	1. 1	0. 6	1. 9
	その他	[%]	3. 0	1. 7	2. 5	1. 3	1. 8	1. 2	0. 7	1. 7
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	40. 2	47. 3	45. 5	48. 3	45. 9	46. 6	42. 1	45. 1
	合成樹脂類	[%]	16. 9	18. 1	16. 3	14. 1	12. 7	11. 7	14. 7	14. 9
	ゴム・皮革類	[%]	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	1. 5	0. 0	0. 0	0. 2
	木・竹・わら類	[%]	13. 9	10. 1	7. 5	13. 3	12. 0	17. 6	16. 1	12. 9
	ちゅう芥類	[%]	24. 9	21. 7	26. 4	22. 2	25. 2	22. 3	26. 2	24. 1
	不燃物類	[%]	1. 5	1. 1	2. 2	0. 7	0. 9	0. 6	0. 3	1. 0
	その他	[%]	2. 6	1. 7	2. 1	1. 4	1. 8	1. 2	0. 6	1. 6
単位容積重量		[kg/m³]	155	148	138	148	149	152	138	147
ごみの3成分	水分	[%]	46. 20	42. 22	44. 89	41. 49	44. 92	45. 13	47. 39	44. 6
	灰分（生ごみ）	[%]	6. 28	6. 36	7. 14	5. 85	6. 08	5. 59	5. 02	6. 0
	可燃分	[%]	47. 52	51. 42	47. 97	52. 66	49. 00	49. 28	47. 59	49. 3
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 861	2, 061	1, 889	2, 121	1, 935	1, 947	1, 857	1, 953
		[kJ/kg]	7, 790	8, 627	7, 907	8, 879	8, 100	8, 150	7, 773	8, 175
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 193	2, 472	2, 240	2, 403	2, 182	2, 121	2, 114	2, 246
		[kJ/kg]	9, 180	10, 348	9, 377	10, 059	9, 134	8, 879	8, 849	9, 404
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 67	11. 00	12. 96	9. 99	11. 03	10. 19	9. 54	10. 91