

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和5年度			
測定年月日			R5. 4. 12	R5. 5. 11	R5. 6. 2	平均
天候			晴	曇	雨	—
気温[℃]			20. 5	21. 0	23. 6	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	50. 8	47. 4	46. 2	48. 1
	合成樹脂類	[%]	18. 5	25. 1	23. 4	22. 3
	ゴム・皮革類	[%]	0. 5	2. 5	1. 4	1. 5
	木・竹・わら類	[%]	14. 1	10. 9	13. 0	12. 7
	ちゅう芥類	[%]	12. 1	10. 5	10. 6	11. 1
	不燃物類	[%]	2. 3	2. 2	3. 3	2. 6
	その他	[%]	1. 7	1. 4	2. 1	1. 7
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	46. 3	45. 3	41. 7	44. 4
	合成樹脂類	[%]	12. 3	17. 1	15. 7	15. 0
	ゴム・皮革類	[%]	0. 3	1. 6	0. 9	0. 9
	木・竹・わら類	[%]	11. 9	10. 4	14. 0	12. 1
	ちゅう芥類	[%]	26. 2	22. 5	23. 5	24. 1
	不燃物類	[%]	1. 2	1. 2	1. 8	1. 4
	その他	[%]	1. 8	1. 9	2. 4	2. 0
単位容積重量		[kg/m³]	168	166	184	173
ごみの3成分	水分	[%]	46. 36	43. 88	46. 49	45. 6
	灰分（生ごみ）	[%]	6. 11	6. 51	6. 39	6. 3
	可燃分	[%]	47. 53	49. 61	47. 12	48. 1
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 861	1, 969	1, 841	1, 890
		[kJ/kg]	7, 790	8, 242	7, 706	7, 913
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 099	2, 377	2, 175	2, 217
		[kJ/kg]	8, 786	9, 950	9, 105	9, 280
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 40	11. 60	11. 95	11. 65

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和 4 年度												
測定年月日			R4. 4. 11	R4. 5. 6	R4. 6. 3	R4. 7. 4	R4. 8. 5	R4. 9. 2	R4. 10. 3	R4. 11. 2	R4. 12. 2	R5. 1. 5	R5. 2. 3	R5. 3. 2	平均
天候			晴	晴	晴	雨	晴	雨	晴	晴	晴	晴	曇	晴	—
気温[℃]			21. 5	19. 2	25. 2	31. 0	38. 0	26. 5	25. 2	17. 0	15. 0	8. 0	6. 2	14. 0	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	47. 8	49. 2	52. 2	52. 8	51. 3	55. 8	50. 0	51. 4	52. 3	49. 1	59. 1	52. 9	52. 0
	合成樹脂類	[%]	27. 5	24. 3	21. 8	24. 5	22. 9	19. 9	25. 5	23. 9	18. 3	21. 6	18. 3	21. 8	22. 5
	ゴム・皮革類	[%]	0. 9	0. 9	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0	1. 1	0. 5	0. 0	0. 0	0. 0	0. 3
	木・竹・わら類	[%]	8. 0	11. 9	12. 2	10. 4	12. 5	10. 8	9. 5	11. 3	13. 7	12. 1	10. 5	11. 4	11. 2
	ちゅう芥類	[%]	10. 0	8. 5	9. 2	7. 7	8. 3	8. 7	11. 2	8. 7	11. 3	12. 4	9. 3	9. 8	9. 6
	不燃物類	[%]	3. 2	3. 6	2. 8	2. 9	3. 5	2. 3	1. 7	2. 3	2. 3	2. 7	1. 5	3. 0	2. 7
	その他	[%]	2. 6	1. 6	1. 8	1. 7	1. 5	2. 5	2. 1	1. 3	1. 6	2. 1	1. 3	1. 1	1. 8
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	44. 1	46. 2	48. 2	49. 1	46. 7	51. 7	48. 2	51. 1	47. 3	45. 7	53. 3	48. 1	48. 3
	合成樹脂類	[%]	19. 2	17. 3	15. 3	17. 9	15. 2	13. 9	16. 6	15. 2	12. 5	14. 8	13. 1	15. 2	15. 5
	ゴム・皮革類	[%]	0. 5	0. 6	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 6	0. 3	0. 0	0. 0	0. 0	0. 2
	木・竹・わら類	[%]	8. 6	10. 6	9. 1	9. 6	12. 2	9. 7	8. 9	10. 2	11. 6	9. 7	8. 3	9. 3	9. 8
	ちゅう芥類	[%]	23. 7	21. 8	24. 3	19. 9	22. 6	20. 8	23. 6	20. 6	25. 5	26. 5	23. 1	24. 5	23. 1
	不燃物類	[%]	1. 8	2. 1	1. 5	1. 7	1. 9	1. 3	0. 9	1. 2	1. 3	1. 5	0. 9	1. 7	1. 5
	その他	[%]	2. 1	1. 4	1. 6	1. 8	1. 4	2. 6	1. 8	1. 1	1. 5	1. 8	1. 3	1. 2	1. 6
単位容積重量		[kg/m³]	154	155	146	152	169	147	162	155	154	176	166	149	157
ごみの3成分	水分	[%]	43. 72	41. 80	45. 52	41. 77	46. 45	43. 50	46. 06	48. 51	44. 09	45. 24	40. 69	42. 87	44. 2
	灰分（生ごみ）	[%]	6. 26	7. 09	6. 06	6. 63	6. 56	6. 35	5. 70	5. 84	5. 94	6. 73	5. 91	6. 85	6. 3
	可燃分	[%]	50. 02	51. 11	48. 42	51. 60	46. 99	50. 15	48. 24	45. 65	49. 97	48. 03	53. 40	50. 28	49. 5
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 989	2, 049	1, 906	2, 071	1, 836	1, 996	1, 894	1, 763	1, 984	1, 890	2, 159	2, 005	1, 962
		[kJ/kg]	8, 326	8, 577	7, 979	8, 669	7, 685	8, 355	7, 928	7, 380	8, 305	7, 912	9, 038	8, 393	8, 212
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 414	2, 474	2, 198	2, 469	2, 154	2, 279	2, 226	2, 133	2, 170	2, 167	2, 364	2, 366	2, 285
		[kJ/kg]	10, 105	10, 356	9, 201	10, 335	9, 017	9, 540	9, 318	8, 929	9, 084	9, 071	9, 896	9, 904	9, 563
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 13	12. 18	11. 13	11. 38	12. 25	11. 24	10. 57	11. 34	10. 62	12. 29	9. 96	11. 99	11. 34

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和3年度												
測定年月日			R3. 4. 5	R3. 5. 14	R3. 6. 4	R3. 7. 2	R3. 8. 2	R3. 9. 3	R3. 10. 1	R3. 11. 1	R3. 12. 2	R4. 1. 7	R4. 2. 4	R4. 3. 3	平均
天候			曇	晴	雨	雨	晴	曇	雨	曇	晴	晴	曇	晴	—
気温[℃]			20. 5	21. 0	25. 5	25. 0	30. 5	25. 0	20. 6	18. 5	11. 8	5. 0	8. 0	11. 0	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[％]	47. 2	58. 6	54. 0	56. 1	52. 4	55. 7	50. 3	60. 3	48. 4	53. 0	46. 0	52. 1	52. 8
	合成樹脂類	[％]	20. 5	14. 8	21. 5	18. 8	23. 5	23. 2	24. 2	19. 5	28. 2	25. 2	28. 0	25. 0	22. 7
	ゴム・皮革類	[％]	1. 6	3. 0	0. 8	0. 5	0. 0	0. 0	4. 4	2. 0	1. 1	0. 5	1. 1	0. 0	1. 3
	木・竹・わら類	[％]	13. 4	9. 5	10. 2	10. 1	9. 3	8. 5	7. 7	8. 2	6. 5	7. 5	8. 0	9. 5	9. 0
	ちゅう芥類	[％]	10. 9	10. 5	8. 4	8. 8	7. 4	7. 6	8. 8	6. 7	9. 7	8. 1	10. 6	8. 1	8. 8
	不燃物類	[％]	2. 4	1. 5	2. 5	1. 6	2. 0	1. 8	2. 4	2. 0	2. 8	3. 1	4. 6	2. 4	2. 4
	その他	[％]	4. 0	2. 1	2. 6	4. 1	5. 4	3. 2	2. 2	1. 3	3. 3	2. 6	1. 7	2. 9	3. 0
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[％]	41. 2	49. 4	47. 2	48. 5	46. 3	53. 7	46. 7	52. 8	44. 7	48. 1	42. 9	51. 2	47. 7
	合成樹脂類	[％]	14. 1	11. 4	16. 1	13. 1	18. 6	16. 2	17. 9	14. 7	19. 3	17. 6	19. 4	16. 1	16. 2
	ゴム・皮革類	[％]	0. 9	2. 1	0. 5	0. 3	0. 0	0. 0	2. 8	1. 3	0. 7	0. 3	0. 7	0. 0	0. 8
	木・竹・わら類	[％]	11. 8	8. 6	10. 4	9. 2	8. 5	7. 3	8. 1	9. 5	6. 4	7. 2	6. 7	8. 2	8. 5
	ちゅう芥類	[％]	27. 2	24. 9	20. 8	23. 7	19. 5	18. 8	20. 5	18. 7	24. 2	22. 2	26. 0	20. 3	22. 2
	不燃物類	[％]	1. 3	0. 9	1. 4	0. 9	1. 3	0. 9	1. 4	1. 2	1. 5	1. 8	2. 6	1. 3	1. 4
	その他	[％]	3. 5	2. 7	3. 6	4. 3	5. 8	3. 1	2. 6	1. 8	3. 2	2. 8	1. 7	2. 9	3. 2
単位容積重量		[kg/m³]	151	145	160	169	150	227	157	155	164	160	161	154	163
ごみの3成分	水分	[％]	46. 65	39. 53	42. 57	44. 89	34. 81	49. 32	42. 71	40. 19	44. 29	41. 30	43. 44	45. 89	43. 0
	灰分（生ごみ）	[％]	5. 82	6. 51	6. 83	5. 86	7. 48	5. 77	6. 19	5. 93	6. 33	6. 60	7. 17	6. 08	6. 4
	可燃分	[％]	47. 53	53. 96	50. 60	49. 25	57. 71	44. 91	51. 10	53. 88	49. 38	52. 10	49. 39	48. 03	50. 7
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 859	2, 191	2, 022	1, 947	2, 388	1, 725	2, 043	2, 183	1, 956	2, 097	1, 962	1, 886	2, 022
		[kJ/kg]	7, 782	9, 172	8, 464	8, 150	9, 996	7, 221	8, 552	9, 138	8, 188	8, 778	8, 213	7, 895	8, 462
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 095	2, 387	2, 346	2, 175	2, 756	1, 988	2, 381	2, 461	2, 362	2, 435	2, 357	2, 252	2, 333
		[kJ/kg]	8, 770	9, 992	9, 820	9, 105	11, 537	8, 322	9, 967	10, 302	9, 887	10, 193	9, 866	9, 427	9, 766
灰分（乾燥ごみ）		[％]	10. 91	10. 77	11. 89	10. 63	11. 47	11. 38	10. 81	9. 92	11. 37	11. 25	12. 68	11. 24	11. 19

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和 2 年度				
測定年月日			R2. 9. 10		R2. 10. 2	R3. 1. 8	平均
天 候			曇		晴	晴	—
気温[℃]			31. 0		24. 2	9. 5	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[％]	51. 5		49. 8	58. 2	53. 2
	合成樹脂類	[％]	16. 0		21. 7	17. 6	18. 4
	ゴム・皮革類	[％]	2. 1		3. 9	0. 0	2. 0
	木・竹・わら類	[％]	12. 7		8. 1	9. 8	10. 2
	ちゅう芥類	[％]	13. 6		9. 9	9. 4	11. 0
	不燃物類	[％]	2. 3		2. 2	1. 9	2. 1
	その他	[％]	1. 8		4. 4	3. 1	3. 1
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[％]	45. 0		41. 9	50. 7	45. 9
	合成樹脂類	[％]	10. 6		15. 1	12. 9	12. 9
	ゴム・皮革類	[％]	1. 4		2. 5	0. 0	1. 3
	木・竹・わら類	[％]	11. 2		9. 3	8. 4	9. 6
	ちゅう芥類	[％]	28. 5		26. 1	24. 2	26. 3
	不燃物類	[％]	1. 2		1. 2	1. 1	1. 2
	その他	[％]	2. 1		3. 9	2. 7	2. 9
単位容積重量		[kg/m ³]	171		139	141	150
ごみの3成分	水分	[％]	48. 25		45. 13	41. 63	45. 0
	灰分（生ごみ）	[％]	5. 84		6. 30	6. 18	6. 1
	可燃分	[％]	45. 91		48. 57	52. 19	48. 9
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 776		1, 915	2, 099	1, 930
		[kJ/kg]	7, 434		8, 016	8, 786	8, 079
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	1, 945		2, 194	2, 302	2, 147
		[kJ/kg]	8, 142		9, 184	9, 636	8, 987
灰分（乾燥ごみ）		[％]	11. 28		11. 48	10. 59	11. 12