

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和 3 年度												
測定年月日			R3. 4. 5	R3. 5. 14	R3. 6. 4	R3. 7. 2	R3. 8. 2	R3. 9. 3	R3. 10. 1	R3. 11. 1	R3. 12. 2	R4. 1. 7	R4. 2. 4	R4. 3. 3	平均
天候			曇												—
気温[℃]			20. 5												—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	47. 2												47. 2
	合成樹脂類	[%]	20. 5												20. 5
	ゴム・皮革類	[%]	1. 6												1. 6
	木・竹・わら類	[%]	13. 4												13. 4
	ちゅう芥類	[%]	10. 9												10. 9
	不燃物類	[%]	2. 4												2. 4
	その他	[%]	4. 0												4. 0
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	41. 2												41. 2
	合成樹脂類	[%]	14. 1												14. 1
	ゴム・皮革類	[%]	0. 9												0. 9
	木・竹・わら類	[%]	11. 8												11. 8
	ちゅう芥類	[%]	27. 2												27. 2
	不燃物類	[%]	1. 3												1. 3
	その他	[%]	3. 5												3. 5
単位容積重量		[kg/m³]	151												151. 0
ごみの3成分	水分	[%]	46. 65												46. 7
	灰分（生ごみ）	[%]	5. 82												5. 8
	可燃分	[%]	47. 53												47. 5
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 859												1, 859
		[kJ/kg]	7, 782												7, 782
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 095												2, 095
		[kJ/kg]	8, 770												8, 770
灰分（乾燥ごみ）		[%]	10. 91												10. 91

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和２年度			
測定年月日			R2. 9. 10	R2. 10. 2	R3. 1. 8	平均
天候			曇	晴	晴	—
気温[℃]			31. 0	24. 2	9. 5	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	51. 5	49. 8	58. 2	53. 2
	合成樹脂類	[%]	16. 0	21. 7	17. 6	18. 4
	ゴム・皮革類	[%]	2. 1	3. 9	0. 0	2. 0
	木・竹・わら類	[%]	12. 7	8. 1	9. 8	10. 2
	ちゅう芥類	[%]	13. 6	9. 9	9. 4	11. 0
	不燃物類	[%]	2. 3	2. 2	1. 9	2. 1
	その他	[%]	1. 8	4. 4	3. 1	3. 1
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	45. 0	41. 9	50. 7	45. 9
	合成樹脂類	[%]	10. 6	15. 1	12. 9	12. 9
	ゴム・皮革類	[%]	1. 4	2. 5	0. 0	1. 3
	木・竹・わら類	[%]	11. 2	9. 3	8. 4	9. 6
	ちゅう芥類	[%]	28. 5	26. 1	24. 2	26. 3
	不燃物類	[%]	1. 2	1. 2	1. 1	1. 2
	その他	[%]	2. 1	3. 9	2. 7	2. 9
単位容積重量		[kg/m³]	171	139	141	150
ごみの成分	水分	[%]	48. 25	45. 13	41. 63	45. 0
	灰分（生ごみ）	[%]	5. 84	6. 30	6. 18	6. 1
	可燃分	[%]	45. 91	48. 57	52. 19	48. 9
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 776	1, 915	2, 099	1, 930
		[kJ/kg]	7, 434	8, 016	8, 786	8, 079
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	1, 945	2, 194	2, 302	2, 147
		[kJ/kg]	8, 142	9, 184	9, 636	8, 987
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 28	11. 48	10. 59	11. 12

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			令和元年度				
測定年月日			H31. 4. 5	R1. 7. 4	R1. 10. 3	R2. 1. 7	平均
天候			晴	雨	曇	曇	—
気温[℃]			16. 5	26. 7	27. 2	9. 5	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	51. 6	47. 8	56. 5	56. 3	53. 1
	合成樹脂類	[%]	18. 6	23. 1	17. 3	14. 9	18. 5
	ゴム・皮革類	[%]	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
	木・竹・わら類	[%]	10. 4	12. 8	11. 6	8. 4	10. 8
	ちゅう芥類	[%]	10. 0	10. 2	9. 6	15. 2	11. 3
	不燃物類	[%]	4. 3	3. 3	2. 8	2. 1	3. 1
	その他	[%]	5. 1	2. 8	2. 2	3. 1	3. 3
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	42. 5	39. 7	48. 7	41. 8	43. 2
	合成樹脂類	[%]	12. 6	15. 8	11. 9	9. 7	12. 5
	ゴム・皮革類	[%]	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0	0. 0
	木・竹・わら類	[%]	9. 5	13. 4	11. 0	8. 8	10. 7
	ちゅう芥類	[%]	29. 2	26. 5	24. 5	35. 5	28. 9
	不燃物類	[%]	2. 4	1. 9	1. 6	1. 1	1. 8
	その他	[%]	3. 8	2. 7	2. 3	3. 1	3. 0
単位容積重量		[kg/m³]	182	165	173	160	170
ごみの成分	水分	[%]	45. 49	41. 30	44. 31	47. 15	44. 6
	灰分（生ごみ）	[%]	7. 12	6. 87	6. 57	6. 16	6. 7
	可燃分	[%]	47. 39	51. 83	49. 12	46. 69	48. 8
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 860	2, 085	1, 945	1, 818	1, 927
		[kJ/kg]	7, 786	8, 728	8, 142	7, 610	8, 067
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 078	2, 366	2, 198	2, 001	2, 161
		[kJ/kg]	8, 699	9, 904	9, 201	8, 376	9, 045
灰分（乾燥ごみ）		[%]	13. 07	11. 71	11. 80	11. 65	12. 06

可燃ごみのごみ質調査結果

年 度			平成 3 0 年度										
測定年月日			H30. 4. 18	H30. 5. 2	H30. 6. 4	H30. 7. 3	H30. 8. 2	H30. 9. 4	H30. 10. 2	H30. 11. 2	H30. 12. 4	H31. 1. 7	平均
天候			晴	曇	晴	晴	晴	雨	晴	晴	晴	晴	—
気温[℃]			17. 0	23. 8	26. 0	32. 0	34. 5	28. 0	24. 5	19. 2	16. 8	10. 5	—
ごみの種類組成（乾ベース）	紙・布類	[%]	47. 9	45. 2	41. 3	56. 1	55. 1	45. 9	43. 6	49. 7	54. 3	47. 6	48. 7
	合成樹脂類	[%]	16. 6	27. 7	26. 8	23. 1	19. 4	15. 5	19. 5	23. 8	20. 7	22. 7	21. 6
	ゴム・皮革類	[%]	5. 2	0. 0	2. 0	0. 0	0. 6	6. 7	0. 0	0. 0	0. 0	1. 8	1. 6
	木・竹・わら類	[%]	12. 1	13. 7	21. 3	10. 6	12. 6	20. 4	20. 1	11. 4	12. 4	12. 7	14. 7
	ちゅう芥類	[%]	13. 3	9. 3	6. 2	9. 0	8. 7	8. 2	9. 1	10. 2	9. 3	9. 3	9. 3
	不燃物類	[%]	3. 2	2. 9	1. 9	0. 8	1. 9	2. 2	5. 5	3. 2	2. 1	4. 3	2. 8
	その他	[%]	1. 7	1. 2	0. 5	0. 4	1. 7	1. 1	2. 2	1. 7	1. 2	1. 6	1. 3
ごみの種類組成（湿ベース）	紙・布類	[%]	38. 3	42. 0	36. 0	46. 7	45. 7	38. 3	35. 7	43. 6	46. 1	41. 8	41. 4
	合成樹脂類	[%]	11. 2	16. 6	18. 3	18. 3	14. 3	10. 2	13. 9	16. 5	13. 7	16. 2	14. 9
	ゴム・皮革類	[%]	3. 3	0. 0	1. 2	0. 0	0. 3	4. 0	0. 0	0. 0	0. 0	1. 2	1. 0
	木・竹・わら類	[%]	14. 0	14. 4	27. 9	14. 0	12. 7	19. 6	22. 1	9. 8	11. 1	11. 4	15. 7
	ちゅう芥類	[%]	30. 0	24. 2	15. 1	20. 2	24. 0	25. 6	22. 8	26. 8	27. 0	25. 2	24. 1
	不燃物類	[%]	1. 8	1. 7	1. 1	0. 4	1. 1	1. 2	3. 2	1. 8	1. 1	2. 6	1. 6
	その他	[%]	1. 4	1. 1	0. 4	0. 4	1. 9	1. 1	2. 3	1. 5	1. 0	1. 6	1. 3
単位容積重量		[kg/m ³]	175	165	174	168	148	164	168	152	172	169	166
ごみの成分	水分	[%]	44. 62	41. 35	42. 74	49. 03	38. 97	45. 25	42. 18	43. 34	47. 39	40. 43	43. 5
	灰分（生ごみ）	[%]	6. 61	6. 66	6. 13	4. 56	6. 51	5. 74	8. 13	6. 43	5. 40	7. 74	6. 4
	可燃分	[%]	48. 77	51. 99	51. 13	46. 41	54. 52	49. 01	49. 69	50. 23	47. 21	51. 83	50. 1
低位発熱量（計算値）		[kcal/kg]	1, 927	2, 091	2, 044	1, 794	2, 220	1, 934	1, 983	2, 000	1, 840	2, 090	1992
		[kJ/kg]	8, 066	8, 753	8, 556	7, 510	9, 293	8, 096	8, 301	8, 372	7, 702	8, 749	8340
低位発熱量（実測値）		[kcal/kg]	2, 189	2, 503	2, 459	2, 109	2, 522	2, 155	2, 228	2, 323	2, 079	2, 398	2297
		[kJ/kg]	9, 163	10, 478	10, 293	8, 828	10, 557	9, 021	9, 326	9, 724	8, 703	10, 038	9613
灰分（乾燥ごみ）		[%]	11. 94	11. 36	10. 71	8. 95	10. 67	10. 49	14. 06	11. 35	10. 27	12. 99	11. 28